

Turner-szindróma

szűrővizsgálati lap



A következő tulajdonságok egy olyan állapottal kapcsolatosak, amely alacsony termettel jár és lányoknál, nőknél fordul elő: **Turner-szindrómának (TS)** nevezik. Sok TS-s lánynál nem diagnosztizálják ezt kilenc éves kora előtt. A külső jellemzők lehet, hogy nem figyelhető meg, vagy csak enyhék; a belső szimptómák fölött pedig könnyű elsiklani. Becslések szerint 2000-ből 1 lány születik TS-sel. Az alábbi lista több, a TS-re jellemző tulajdonságot sorol fel, és nem teljes. Minden Turner-szindrómás lány egyedi, így a tünetek különböző mértékben és előfordulással mutatkozhatnak meg náluk.

Bármely gyermek esetében, aki a növekedési skálán 3% alatti tartományba esik, konzultálni kell a gyermekorvosával, mivel ez egészségügyi problémát jelezhet.

Fizikális megfigyelések

- társainál jelentősen alacsonyabb
- lusta szem
- nem kiemelkedő áll
- magasan ívelt szájpad
- szorosan álló fogak
- lenőtt nyaki hajvonal
- nyaki bőrredő
- a kar a könyöknél enyhén kifelé fordul
- sok anyajegy
- zömök megjelenés
- széles mellkas
- lábfej dagadása van / volt
- rövid 4. kéz/láb-ujj
- szemüveges

Egészségügyi megfigyelések

- a növekedési skálán 3% alatt van
- a nemi fejlődés életkor szerinti elmaradása
- gyakori fülgyulladás
- dobhártya problémák vagy hallásvesztés
- tejfogak hamar kihullnak
- húgyúti fertőzések gyakorisága
- szkoliózis
- pajzsmirigy problémák
- cöliákia (lisztérzékenység)
- kardiológiai eltérések
- vese rendellenességek (pl. patkóvese)

Szociális megfigyelések

- társainál enyhén éretlenebb
- kiváló beszédképesség
- gyengébb számtani képesség
- rutin fontossága
- energikus
- fejlesztés szükséges a tanulásban
- sokat időzik egyes témákon vagy bizonyos ötleteknél leragad
- társai gyakran elutasítják
- nem törődik a fizikai fájdalommal
- szétszórt
- több időre van szüksége a feladat elvégzéséhez

A FORDÍTÁS AZ AMERIKAI TURNER-SZINDRÓMA TÁRSASÁG (TSSUS - TURNER SYNDROME SOCIETY OF THE UNITED STATES) DOKUMENTUMA ALAPJÁN ÉS ENGEDÉLYÉVEL KÉSZÜLT.