

## **CSECSEMŐKOR**

### *TURNER-SZINDRÓMÁS LÁNYOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA 1 HÓNAPOS KORTÓL 1 ÉVES KORIG:*

- **Mérjük meg** a csecsemő **súlyát**, de gondoljuk át, hogy sok veleszületett nyiroködémával élő csecsemő veszít a súlyából az első hónapban a fokozott vizelet-kiválasztás miatt.
- Minden orvosi vizsgálat alkalmával mérjük meg a gyermek **vérnyomást** és a **pulzusát**. Alaposan össze kell hasonlítani a **karon és a lábszáron** mért szisztolés vérnyomást, mert fontos az esetleges aortaszűkület felismerésében
- Ha **magas a vérnyomása**, a vérnyomást **normalizáló kezelés** javasolt és alaposan **vizsgáljuk ki**, hogy nem áll-e mögötte szív- ill. veseprobléma.
- Ha **szívrendellenesség** áll fenn, betegünket olyan **gyakran küldjük kardiológiai vizsgálatra**, amilyen gyakran a kardiológusa javasolta. Biztosítsuk a **szubakut bakteriális endokarditisz megelőző** kezelését, bár a szubakut bakteriális endokarditisz csecsemőkorban ritka.
- Minden orvosi vizsgálat alkalmával figyeljük, hogy nem áll-e fenn **fülgyulladás** vagy **középfülgyulladás**, amennyiben a gyermeknek középfülgyulladása van, alkalmazzunk **agresszív kezelést**. Vizsgáljuk meg a gyermek **hallását** is (6 és 12 hónapos korban objektíven, és 4 hónapos kor előtt, ha az újszülöttkori szűrést nem végezték el). Ha idegi eredetű hallásvesztést azonosítanak, javasoljuk a hallás-segítők használatának megfontolását, melyeket már akár 3 hónapos kortól alkalmazni lehet.
- Magyarazzuk el a szülőknek, hogy mely **környezeti hatások növelhetik a középfülgyulladás veszélyét**, mint pl. a cumisüvegből való etetés, a passzív dohányzás és a gyermekközösségek látogatása. Makacs középfülgyulladás esetén beszéljük át a fültubus lehetőségét, és fontoljuk meg a gyermek fül-orr-gégészetre való beutalását
- Ha a **húgyvezetékben** tapasztalhatók **elváltozások**, végezzünk **vizeletvizsgálatot és tenyésztést**, ha egy esetleges húgyvezeték gyulladás indokolttá teszi. **Ultrahang vizsgálat** javasolt abban az esetben, ha a húgyvezeték-gyulladás visszatérő, vagy ha magas vérnyomás alakul ki.
- Végezzünk **szemészeti vizsgálatot**. Nem-konvergens kancsalság is jelen lehet, ennek TS- ben relative nagyobb gyakorisága miatt 12-18 hónapos kor között csecsemő-szemészeti vizsgálat szükséges.
- Fontoljuk meg a csecsemő megfelelő **gyermekspecialistához való továbbutalását**, ha vese- vagy szem - **rendellenességeket** találunk.
- **Utaljuk a csecsemőt korai fejlődést segítő programba**, ha a **neuromuszkuláris fejlődése** lemarad.