

AZ IMMUNRENDSZER

A Turner-szindróma szempontjából

Pajzsmirigy

A Turner-szindrómás nők 10- 30%-ánál előfordulhat **hipotireózis**, amit rendszerint autoimmun betegség okoz. Ennek gyakori formája a **Hashimoto-féle thyroiditis**.

A pajzsmirigy alulműködés kockázata az évekkel növekedhet. A hipotireózis tünetei lehetnek: szorulás, csökkent energiaszint, száraz bőr, súlynövekedés; ezek gyakran enyhék, ezért ajánlott a pajzsmirigyfunkciót ellenőrizni a diagnóziskor és ez után minden 1 vagy 2 évben, az egész élet során. Vérvétellel diagnosztizálható, és kezelhető pajzsmirigy hormon pótlás segítségével.

Más autoimmun problémák

A Turner-szindrómás nők esetében úgy néz ki, hogy a normálisnál nagyobb a kockázata az autoimmun problémáknak, úgy mint a **coeliakia**, **gyulladásos bélbetegségek**, valamint **rheumatoid arthritis**.

Az emésztési panaszokkal vagy ízületi problémával rendelkező nőknek ajánlott alapos orvosi vizsgálaton részt venni, esetenként szükséges lehet specialistaéhoz, szakorvoshoz is fordulni.

A kezelés jelenthet étrend változtatást (bélpanaszok esetén) és gyógyszeres kezelést.

Megfigyelések szerint a **májfunkciós enzimek emelkedése** a TS-es nők akár 30%-ánál is jelentkezhet. Ez általában nem kötődik semmilyen más májműködési rendellenességhez.

Egyes nőknél ennek autoimmun folyamat az oka, másoknál pedig a túlsúlyhoz kapcsolódhat.